

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE ALL'ESAME TC CON MEZZO DI CONTRASTO

Il giorno dell'esame:

- portare in visione i risultati, **eseguiti da non più di 30 giorni**, dell'esame della CREATININEMIA con Filtrato Glomerulare
- presentarsi **a digiuno da almeno 6 ore**
- assumere le eventuali terapie farmacologiche in atto secondo lo schema abituale
- i pazienti diabetici in terapia con METFORMINA devono sospendere il farmaco nei 2 giorni precedenti e nei 2 giorni successivi l'esame solo se il Filtrato Glomerulare è inferiore a 45 ml/min (chiedere al proprio Medico Curante anche per eventuale terapia sostitutiva)

Importante:

- portare la richiesta del Medico (Curante o dello Specialista) con preciso quesito diagnostico
- portare gli esami radiologici precedenti relativi al distretto da esaminare (torace, addome, articolazione), esempio: Radiografie, Ecografie, TC, RM, angiografie, scintigrafie, PET...
- portare la documentazione medica utile per l'esame da svolgere (referti di visite specialistiche, lettere di dimissione ospedaliera, resoconti interventi chirurgici, esami istologici, ecc.)
- in caso di allergia al mezzo di contrasto o gravi allergie a farmaci o sostanze, rivolgersi al proprio Medico Curante e presentare il protocollo di pre-medicazione allegato.

ISTRUZIONI PER LA PREMEDICAZIONE IN PAZIENTI CON ALLERGIA AL MEZZO DI CONTRASTO

Ai pazienti che presentino una storia **CERTA o sospetta di reazioni avverse a farmaci e mezzi di contrasto**, viene suggerito il seguente protocollo di premedicazione, che ha lo scopo di prevenire o limitare le eventuali reazioni.

Il presente protocollo di premedicazione è da effettuarsi in accordo con il "Memorandum della Società italiana di Allergologia e Immunologia Clinica per la diagnosi delle Intolleranze a farmaci" che prevede la somministrazione di farmaci cortisonici, anti-istaminici ed anti -H2 come di seguito riportato:

È necessario farsi prescrivere dal proprio medico di famiglia il seguente farmaco cortisonico:

PREDNISONONE = DELTACORTENE FORTE compresse 25 mg

Modalità di assunzione:

- N°2 compresse 13 ore prima dell'esame
- N°2 compresse 7 ore prima dell'esame
- N°2 compresse 1 ora prima dell'esame

Verrà inoltre somministrato, dal personale infermieristico del servizio di Radiologia, per via parenterale 1 ora prima dell'esame, il farmaco TRIMETON in fiala da 10 mg.

Importante:

L'antistaminico (TRIMETON) può procurare sonnolenza, è quindi consigliabile venire accompagnati e non guidare autoveicoli subito dopo l'esame

Il Direttore Sanitario
Medico Radiologo
Dott. Fabrizio Abelli